

BESCHREIBUNG DES REBBAUSEKTORS **A** DER GEMEINDE RARON

Lokal oder Katasternamen	Unter der Fluh - Kummeltin - Steinschlag - Toli - Brachen - Eich - Lowinen	
Fläche des Sektors in ha	3.93 ha	
Höhe (Meter über Meer)	zu unterst des Sektors: 750 m. zu oberst des Sektors: 870 m. durchschnittliche Höhe des Sektors 810 m.	
Lage	Süd Ost (SO)	
Hangneigung	Maximale: % ; Durchschnittliche: 30-50 % ; Minimale : % - Terrassen	
Natur des Bodens (Körnung)	Ton : : 9 % Schluff : 34 % Sand: 57 %	Kiesgehalt : XXX
Mittlerer Kalkgehalt des Bodens	Total : 25 % Activ : % *IVP (Chloroseindex)	
Bodenprofil (e)	vorhanden RARO 14	
Geo-Pedologische Beschreibung	vorhanden RARO 14 ex. : (Studie über das Terroire)	
Rebsortenverzeichnis:		
Grand Cru Rebsorte <input type="checkbox"/> VV <input type="checkbox"/> GC	Besonders gut dem Sektor oder Teilsektor angepasste Rebsorte die es erlaubt einen Wein von grosser Qualität zu produzieren (Typizität des Terroirs)	
Angepasste Rebsorte <input type="checkbox"/> VV	Rebsorte die dafür bürgt einen sehr guten Wein aus diesem Sektor zu produzieren	
Erlaubte Rebsorte <input type="checkbox"/> V	Rebsorte die es erlaubt einen guten Wein zu gewinnen, eine tiefere Studie ist jedoch angebracht.	
Schlecht angepasste Rebsorte <input type="checkbox"/> X	Rebsorte bei der die Qualität des Weins mittelmässig ist. Beim nächsten Wiederaufbau ist eine andere Rebsorte anzupflanzen.	
Verbotene Rebsorte <input type="checkbox"/> X X	Rebsorte bei der die Qualität des Weines in diesem Sektor ungenügend ist und für die Erzeugung von AOC-Weinen verboten werden kann.	
* : Gemeinden die bereits über ein Grand-Cru Reglement verfügen oder dies einzuführen möchten, müssen die Rebsorte in den Rebbausektoren klar bezeichnen in denen Grand-Cru Weine produziert werden. Rebsorten (maximal 4) die zukünftig zur Verarbeitung als Grand-Cru Weine bestimmt sind, werden durch die beauftragte Kommission zur „Verfeinerung der Rebbausektoren“ ausgewählt. Die Aufnahme erfolgt anhand eines Reglements, dass durch die Gemeinde oder der beauftragten Kommission gemäss der kantonalen Gesetzgebung und der Kontrollverordnung der Branchenorganisation der Weinwirtschaft erstellt wurde.		
WEISSE REBSORTEN		
Petite Arvine (3) : V	:	:
Chasselas (1) : VV	:	:
Müller Thurgau (f) : VV	:	:
uscat (1 bis 2) : V	:	:
Pinot gris (Malvoisie) (1) : V	:	:
Riesling (2) : V	:	:
Sauvignon blanc (1 bis 2) : V	:	:
Sylvaner Gros Rhin(1 bis 2) : V	:	:
ROTE REBSORTEN		
Cornalin du Valais (Landroter)(3) : X	:	:
Diolinoir (1 bis 2) : V	:	:
Gamaret (1) : V	:	:
Gamay (1) : VV	:	:
Pinot noir (1) : VV	:	:
Syrah (2 bis 3) : X	:	:

- F bis SF : - Frühreif bis sehr frühreif : bei der Reife mehr als zehn Tage vor dem Chasselas
 F : - Frühreif : bei der Reife mehr als fünf Tage vor dem Chasselas
 1 : - Erste Epoche : bei der Reife fünf Tage vor / nach dem Chasselas;
 2 : - Zweite Epoche : bei der Reife fünf bis 15 Tage nach dem Chasselas
 3 : - Dritte Epoche : bei der Reife 15 bis 30 Tage nach dem Chasselas

Bemerkungen:

1. Die Qualifizierung einer Rebsorte in eine der 4 vorgenannten Klassen ist nur technischer und qualitativer Natur. Bei einem Wiederaufbau der Parzellen ist es überaus wichtig, mit dem Einkeller Kontakt aufzunehmen.
2. Jede in einem Sektor angepflanzte Rebsorte muss zwingend einer der 4 Klassen zugeteilt werden.
3. Zu Versuchszwecken angepflanzte Rebsorten haben kein Anrecht auf die AOC-Bezeichnung und werden auch nicht in einer der 4 vorgenannten Klassen aufgeführt
4. **Das kantonale Weinbauramt macht die Gemeinde darauf aufmerksam, dass die Sylvaner-Parzellen, welche über 700 M.ü.M. angebaut sind, keinen Anspruch auf die AOC-Bezeichnung haben (RWV, Art. 11, Abs. 3)..**

BESCHREIBUNG DES REBBAUSEKTORS **B** DER GEMEINDE RARON

Lokal oder Katasternamen	Tscherggen - Tscherggweg - Frauenmatten - Spisseggen - Kummensand - Kummendörfli - Zettin - Strippinen - Neue Egge	
Fläche des Sektors in ha	4.45 ha	
Höhe (Meter über Meer)	zu unterst des Sektors: 680 m. zu oberst des Sektors: 800 m. durchschnittliche Höhe des Sektors 740 m.	
Lage	Süd Ost (SO)	
Hangneigung	Maximale: % ; Durchschnittliche: 30-50 % ; Minimale : % - Terrassen	
Natur des Bodens (Körnung)	Ton : : 9 % Schluff : : 34 % Sand: : 57 %	Kiesgehalt : XXX
Mittlerer Kalkgehalt des Bodens	Total : 25.0 % Activ : % *IVP (Chloroseindex)	
Bodenprofil (e)	vorhanden RARO 13/14	
Geo-Pedologische Beschreibung	vorhanden RARO 13/14 ex. : (Studie über das Terroire)	
Rebsortenverzeichnis:		
Grand Cru Rebsorte <input type="checkbox"/> VV GC	Besonders gut dem Sektor oder Teilsektor angepasste Rebsorte die es erlaubt einen Wein von grosser Qualität zu produzieren (Typizität des Terroirs)	
Angepasste Rebsorte <input type="checkbox"/> VV	Rebsorte die dafür bürgt einen sehr guten Wein aus diesem Sektor zu produzieren	
Erlaubte Rebsorte <input type="checkbox"/> V	Rebsorte die es erlaubt einen guten Wein zu gewinnen, eine tiefere Studie ist jedoch angebracht.	
Schlecht angepasste Rebsorte <input checked="" type="checkbox"/> X	Rebsorte bei der die Qualität des Weins mittelmässig ist. Beim nächsten Wiederaufbau ist eine andere Rebsorte anzupflanzen.	
Verbotene Rebsorte <input checked="" type="checkbox"/> XX	Rebsorte bei der die Qualität des Weines in diesem Sektor ungenügend ist und für die Erzeugung von AOC-Weinen verboten werden kann.	
* : Gemeinden die bereits über ein Grand-Cru Reglement verfügen oder dies einzuführen möchten, müssen die Rebsorte in den Rebbausektoren klar bezeichnen in denen Grand-Cru Weine produziert werden. Rebsorten (maximal 4) die zukünftig zur Verarbeitung als Grand-Cru Weine bestimmt sind, werden durch die beauftragte Kommission zur „Verfeinerung der Rebbausektoren“ ausgewählt. Die Aufnahme erfolgt anhand eines Reglements, dass durch die Gemeinde oder der beauftragten Kommission gemäss der kantonalen Gesetzgebung und der Kontrollverordnung der Branchenorganisation der Weinwirtschaft erstellt wurde.		
WEISSE REBSORTEN		
Chardonnay (1) : V	Riesling (2) : V	:
Chasselas (1) : VV	Sylvaner Gros Rhin(1 bis 2) : VV	:
Gwäss (2 bis 3) : V	:	:
Sfnetscha (1) : VV	:	:
Müller Thurgau (f) : VV	:	:
Muscat (1 bis 2) : VV	:	:
Pinot blanc (1) : V	:	:
Pinot gris (Malvoisie) (1) : V	:	:
ROTE REBSORTEN		
Cornalin du Valais (Landroter)(3) : V	:	:
Gamay (1) : VV	:	:
Merlot (2) : V	:	:
Pinot noir (1) : VV	:	:
Syrah (2 bis 3) : V	:	:
:	:	:

- F bis SF : - Frühreif bis sehr frühreif : bei der Reife mehr als zehn Tage vor dem Chasselas
 F : - Frühreif : bei der Reife mehr als fünf Tage vor dem Chasselas
 1 : - Erste Epoche: bei der Reife fünf Tage vor / nach dem Chasselas;
 2 : - Zweite Epoche : bei der Reife fünf bis 15 Tage nach dem Chasselas
 3 : - Dritte Epoche : bei der Reife 15 bis 30 Tage nach dem Chasselas

Bemerkungen:

1. Die Qualifizierung einer Rebsorte in eine der 4 vorgenannten Klassen ist nur technischer und qualitativer Natur. Bei einem Wiederaufbau der Parzellen ist es überaus wichtig, mit dem Einkeller Kontakt aufzunehmen.
2. Jede in einem Sektor angepflanzte Rebsorte muss zwingend einer der 4 Klassen zugeteilt werden.
3. Zu Versuchszwecken angepflanzte Rebsorten haben kein Anrecht auf die AOC-Bezeichnung und werden auch nicht in einer der 4 vorgenannten Klassen aufgeführt
4. **Das kantonale Weinbauamt macht die Gemeinde darauf aufmerksam, dass die Sylvaner-Parzellen, welche über 700 M.ü.M. angebaut sind, keinen Anspruch auf die AOC-Bezeichnung haben (RWV, Art. 11, Abs. 3)**

BESCHREIBUNG DES REBBAUSEKTORS **C** DER GEMEINDE RARON

Lokal oder Katasternamen	Hohenstueden - Setzacker - Moos - Egerten - Flugsenegge - Blaueneggin - Mahngasse - Kummerdörfli West - Gruben - Grubenstuetz - Strippinen - Steinrischinen - Hasenlehn - Zugmatten - Schlendwang - Kummensand - Bittrich	
Fläche des Sektors in ha	11.35 ha	
Höhe (Meter über Meer)	zu unterst des Sektors: 640 m. zu oberst des Sektors: 750 m. durchschnittliche Höhe des Sektors 700 m.	
Lage	Süd Ost (SO)	
Hangneigung	Maximale: % ; Durchschnittliche: 30-50 % ; Minimale : % - Terassen	
Natur des Bodens (Körnung)	Ton : : 8 % Schluff : 36 % Sand: : 56 %	Kiesgehalt : XXX
Mittlerer Kalkgehalt des Bodens	Total : 15.0 % Activ : % *IVP (Chloroseindex)	
Bodenprofil (e)	kein	
Geo-Pedologische Beschreibung	keine ex. : (Studie über das Terroire)	
Rebsortenverzeichnis:		
Grand Cru Rebsorte	<input type="checkbox"/> VV <input type="checkbox"/> GC	Besonders gut dem Sektor oder Teilsektor angepasste Rebsorte die es erlaubt einen Wein von grosser Qualität zu produzieren (Typizität des Terroirs)
Angepasste Rebsorte	<input type="checkbox"/> VV	Rebsorte die dafür bürgt einen sehr guten Wein aus diesem Sektor zu produzieren
Erlaubte Rebsorte	<input type="checkbox"/> V	Rebsorte die es erlaubt einen guten Wein zu gewinnen, eine tiefere Studie ist jedoch angebracht.
Schlecht angepasste Rebsorte	<input type="checkbox"/> X	Rebsorte bei der die Qualität des Weins mittelmässig ist. Beim nächsten Wiederaufbau ist eine andere Rebsorte anzupflanzen.
Verbotene Rebsorte	<input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> X	Rebsorte bei der die Qualität des Weines in diesem Sektor ungenügend ist und für die Erzeugung von AOC-Weinen verboten werden kann.
* : Gemeinden die bereits über ein Grand-Cru Reglement verfügen oder dies einzuführen möchten, müssen die Rebsorte in den Rebbausektoren klar bezeichnen in denen Grand-Cru Weine produziert werden. Rebsorten (maximal 4) die zukünftig zur Verarbeitung als Grand-Cru Weine bestimmt sind, werden durch die beauftragte Kommission zur „Verfeinerung der Rebbausektoren“ ausgewählt. Die Aufnahme erfolgt anhand eines Reglements, dass durch die Gemeinde oder der beauftragten Kommission gemäss der kantonalen Gesetzgebung und der Kontrollverordnung der Branchenorganisation der Weinwirtschaft erstellt wurde.		
WEISSE REBSORTEN		
Bianca : V	Müller Thurgau (f) : V	:
tite Arvine (3) : VV	Muscat (1 bis 2) : VV	:
ardonnay (1) : VV	Pinot blanc (1) : VV	:
Chasselas (1) : VV	Pinot gris (Malvoisie) (1) : VV	:
Gewürztraminer (f) : V	Riesling (2) : V	:
Gwäss (2 bis 3) : VV	Savagnin blanc (Heida) (1 bis ") : VV	:
Humagne blanc (2) : V	Sylvaner Gros Rhin(1 bis 2) : VV	:
Lafnetscha (1) : V	:	:
ROTE REBSORTEN		
Carminoir (2 bis 3) : V	Garanoir (F) : V	:
Cornalin du Valais (Landroter)(3) : VV	Humagne rouge (3) : VV	:
Diolinoir (1 bis 2) : V	Pinot noir (1) : VV	:
Eyholzer Roter (2) : V	Syrah (2 bis 3) : VV	:
Gamaret (1) : V	:	:
Gamay (1) : VV	:	:

- F bis SF : - Frühreif bis sehr frühreif : bei der Reife mehr als zehn Tage vor dem Chasselas
 F : - Frühreif : bei der Reife mehr als fünf Tage vor dem Chasselas
 1 : - Erste Epoche: bei der Reife fünf Tage vor / nach dem Chasselas;
 2 : - Zweite Epoche : bei der Reife fünf bis 15 Tage nach dem Chasselas
 3 : - Dritte Epoche : bei der Reife 15 bis 30 Tage nach dem Chasselas

Bemerkungen:

Das kantonale Weinbauamt macht die Gemeinde darauf aufmerksam, dass die Sylvaner-Parzellen, welche über 700 M.ü.M. angebaut sind, keinen Anspruch auf die AOC-Bezeichnung haben (RWV, Art. 11, Abs. 3)..

Der Müller –Thurgau reift in den exponierten Lagen des Sektors zu schnell und sollte hier nicht angepflanzt werden

BESCHREIBUNG DES REBBAUSEKTORS **D** DER GEMEINDE RARON

Lokal oder Katasternamen	Kletten - Leimern - Gebreiten - Bieltin - Frumbaum - Birkengrund - Oberen Stein - Kalkofenhalde - Gufern - Laushalde - Frauenmatten - Spisseggen - Kirchengut - Raron - Hubel	
Fläche des Sektors in ha	6.65 ha	
Höhe (Meter über Meer)	zu unterst des Sektors: 640 m. zu oberst des Sektors: 700 m. durchschnittliche Höhe des Sektors 670 m.	
Lage	Süd Ost (SO)	
Hangneigung	Maximale: % ; Durchschnittliche: 30-50 % ; Minimale : % - Terassen	
Natur des Bodens (Körnung)	Ton : : 7 % Schluff : 47 % Sand: : 46 %	Kiesgehalt : XX
Mittlerer Kalkgehalt des Bodens	Total : 8.0 % Activ : % *IVP (Chloroseindex)	
Bodenprofil (e)	vorhanden RARO 11/12	
Geo-Pedologische Beschreibung	vorhanden RARO 11/12 ex. : (Studie über das Terroire)	
Rebsortenverzeichnis:		
Grand Cru Rebsorte <input type="checkbox"/> VV GC	Besonders gut dem Sektor oder Teilsektor angepasste Rebsorte die es erlaubt einen Wein von grosser Qualität zu produzieren (Typizität des Terroirs)	
Angepasste Rebsorte <input type="checkbox"/> VV	Rebsorte die dafür bürgt einen sehr guten Wein aus diesem Sektor zu produzieren	
Erlaubte Rebsorte <input type="checkbox"/> V	Rebsorte die es erlaubt einen guten Wein zu gewinnen, eine tiefere Studie ist jedoch angebracht.	
Schlecht angepasste Rebsorte <input checked="" type="checkbox"/> X	Rebsorte bei der die Qualität des Weins mittelmässig ist. Beim nächsten Wiederaufbau ist eine andere Rebsorte anzupflanzen.	
Verbotene Rebsorte <input checked="" type="checkbox"/> XX	Rebsorte bei der die Qualität des Weines in diesem Sektor ungenügend ist und für die Erzeugung von AOC-Weinen verboten werden kann.	
* : Gemeinden die bereits über ein Grand-Cru Reglement verfügen oder dies einzuführen möchten, müssen die Rebsorte in den Rebbausektoren klar bezeichnen in denen Grand-Cru Weine produziert werden. Rebsorten (maximal 4) die zukünftig zur Verarbeitung als Grand-Cru Weine bestimmt sind, werden durch die beauftragte Kommission zur „Verfeinerung der Rebbausektoren“ ausgewählt. Die Aufnahme erfolgt anhand eines Reglements, dass durch die Gemeinde oder der beauftragten Kommission gemäss der kantonalen Gesetzgebung und der Kontrollverordnung der Branchenorganisation der Weinwirtschaft erstellt wurde.		
WEISSE REBSORTEN		
Chardonnay (1) : V	Savagnin blanc (Heida) (1 bis 2) : V	:
Chasselas (1) : VV	Sylvaner Gros Rhin(1 bis 2) : VV	:
wäss (2 bis 3) : V	:	:
müller Thurgau (f) : VV	:	:
Muscat (1 bis 2) : VV	:	:
Petite Arvine (3) : V	:	:
Pinot gris (Malvoisie) (1) : V	:	:
Riesling (2) : V	:	:
ROTE REBSORTEN		
Cornalin du Valais (Landroter)(3) : VV	Syrah (2 bis 3) : V	:
Diolinoir (1 bis 2) : V	:	:
Gamaret (1) : V	:	:
Gamay (1) : VV	:	:
Humagne rouge (3) : VV	:	:
Pinot noir (1) : VV	:	:

- F bis SF : - Frühreif bis sehr frühreif : bei der Reife mehr als zehn Tage vor dem Chasselas
 F : - Frühreif : bei der Reife mehr als fünf Tage vor dem Chasselas
 1 : - Erste Epoche: bei der Reife fünf Tage vor / nach dem Chasselas;
 2 : - Zweite Epoche : bei der Reife fünf bis 15 Tage nach dem Chasselas
 3 : - Dritte Epoche : bei der Reife 15 bis 30 Tage nach dem Chasselas

Bemerkungen:

Die Rebsorten Arvine – Muskat – Sylvaner – Cornalin – Humagne rouge – Syrah sollten nur in Lokalnamen Kletten – Leimern – Gebreiten – Bieltin – Frumbaum angepflanzt werden

