



PRODUITS DE TRAITEMENTS POUR LE JARDIN FAMILIAL

RAVAGEURS	REMARQUES	INSECTICIDES – ACARICIDES * produits biologiques
<i>Pucerons</i>	Intervenir sur les colonies en formation : observer les bourgeons et la face inférieure des feuilles	sur légumes : Pirimor ou Natural* = Sanoplant spray* = Siva 50* sur ornementaux : Actara
<i>Insectes divers</i> Chenilles du feuillage Altises Mouche de l'asperge Teigne du poireau ----- Thrips de l'oignon du poireau	- intervenir sur les jeunes chenilles (1-2 cm); contrôler le dessous des feuilles (pontes, chenilles) - observer les petits trous sur les feuilles - protéger les jeunes cultures de mi-avril à début juin - observer les 1ères galeries de la teigne : bien mouiller pour faire pénétrer le produit à la base des feuilles ----- contrôler en écartant les jeunes feuilles (les thrips se cachent dans le cœur des plantes)	Pyrethrum FS* / Parexan N* Karaté ----- Audienz*
Mouches de la carotte du chou	- pose de filets anti-insectes dès le semis ou la plantation, l'enlever 2-3 semaines avant la récolte - traitement par arrosage au pied (1dl/plante) ou sur la ligne de semis (0,5 litre /mètre linéaire)	Filbio (Biocontrol, tél. 062/917.50.05) Audienz 0.3% => arrosage des plantons
Doryphore pomme de terre	- 1 à 2 applications contre les larves et les adultes	Audienz*
Araignée jaune fraise framboise concombre, melon haricot, aubergine	- observer la face inférieure des feuilles, décoloration du limbe le long des nervures ; - traiter avant fleur et/ou après récolte - intervenir bien avant le tissage de toiles	Natural = Sanoplant spray = Siva 50*
Courtilière	-épandre les appâts près des plantes fraîchement rongées	Cortilan, Blocade
Anthonomes fraise Anthonomes framboise Vers des framboises	- traiter début floraison	Alanto
Limaces Coïtron	- ne pas mettre les appâts sur les parties comestibles	Produit à base de Metaldehyde : Metarex, Anti-limaces, Evitoxal ...
MALADIES	REMARQUES	FONGICIDES
Alternariose carotte Septoriose céleri Alternariose, Septoriose, Bactériose tomate Cercosporiose betterave et autres Mildiou oignon, tomate, pomme de terre	- choix de variétés peu sensibles - fumure azotée (fumier) modérée - bonne aération du feuillage = densité de semis ou de plantation faible, désherbage régulier - arrosage le matin = séchage rapide du feuillage - ne pas employer le Cuivre sur les légumes feuilles - traiter dès l'observation des 1ères taches sur les feuilles et par temps humide - le feuillage ne doit pas rester mouillé !!!	Cuivre 50* Amistar
Oïdium cucurbitacées rosiers	- variétés tolérantes - variétés tolérantes ou traiter les nouvelles pousses	Soufre* / Armicarb* / Amistar Belrose contre les maladies fongiques

Observer attentivement les indications citées sur les emballages !!!

Le dosage indiqué sur l'emballage permet de calculer :

1% = 100 gr pour 10 litres d'eau
0,1% = 10 gr pour 10 litres d'eau
0,05% = 5 gr pour 10 litres d'eau

} 10 litres de bouillie servent à traiter une surface cultivée de 100 m²

Pour éviter d'avoir des **résidus** de pesticides sur les légumes, il faut respecter le **dosage** et le **délai d'attente** (période entre le dernier traitement et la récolte), celui-ci est indiqué sur les emballages; il peut varier de 3 jours à 6 semaines selon la culture et le produit.