

PLAN DE TRAITEMENT MINIMAL POUR VERGERS FAMILIAUX

- Pommier

Epoque	Maladies et Parasites	Produits
1. Débourrement (gonflement des bourgeons)	Pou San José Diverses maladies	Huile de paraffine (3,5 % avant débourement ou 2 % au débourement) Cuivre 50 à 0.2%
2. Avant-fleur	Tavelure + Oïdium	Sythane C
3. Après-fleur	Tavelure + Oïdium Pucerons (feuilles enroulées et fruits déformés)	Flint C Pirimor ou Alanto
4. Début juin	Tavelure + Oïdium	Captane + Soufre
5. Mi-juin	Tavelure + Oïdium Carpocapse (ver des fruits)	Captane + Soufre Carpovirusine ou Madex, 4 fois à 10 jours d'intervalle ou Audienz, 3 fois à 12 jours d'intervalle
6. Début juillet	Tavelure + Oïdium	Captane + Soufre
7. Début août	Maladies de conservation	Folpet (trois semaines avant récolte)
8. Mi-août	Maladies de conservation	Folpet sur variétés tardives

Adaptations pour les autres espèces

- **Poirier** Traitements **N° 1** et **N° 3**, éventuellement **N° 5** (sans soufre);
Psylles : en juin éliminer les pousses inutiles et arrosage intensif du feuillage pour nettoyer le miellat ou traitement à volume élevé (3-5 litres par arbre) avec un mouillant (savon) à 0.1%.
- **Cerisier** Traitements **N° 1** et **N° 3**.
Moniliose : en cas de menace de pluie durant la floraison traiter 1 fois avec Rondo Duo ou Flint C.
Mouche de la cerise : pour les variétés tardives pièges englués jaunes et/ou 2 fois Alanto à 1 semaine d'intervalle dès que les cerises commencent à rougir.
- **Prunier** Traitements **N° 1** et **N° 3**.
En juin si forte présence de **Pucerons farineux**: Pirimor.
Carpocapse (ver des prunes): dès début juillet Audienz 2 fois à 12 jours d'intervalle.
- **Abricotier** Traitement **N° 1** : Cuivre seul, **sans** huile minérale.
Moniliose (dessèchement des fleurs et des petites branches): traiter avant la pluie durant la floraison avec Flint C ou Sythane C; en cas de besoin répéter 7 jours plus tard. Eliminer rapidement toutes les branches et les fruits secs.
Maladie criblée : une application avec les mêmes produits à la chute des capuchons.
- **Pêcher** **Cloque** : maladie la plus redoutable du pêcher (feuillage fortement enroulé et cloqué); fin février avant le débourement, traiter soigneusement au Cuivre 50 à 0,3 %.
Traitements **N° 1** et **N° 3** (dès apparition des **pucerons**).

Le dosage indiqué sur l'emballage permet de calculer :

1 %	=	100 g ou 100 ml	pour 10 litres d'eau
0,1 %	=	10 g ou 10 ml	pour 10 litres d'eau
0,05 %	=	5 g ou 5 ml	pour 10 litres d'eau

Pour l'**atomiseur** concentrer 3 à 4 fois les produits autres que l'huile minérale.

Pour éviter des résidus intolérables sur les fruits, il faut respecter le **dosage** ainsi que le **délai d'attente** entre le dernier traitement et la récolte. Ces indications sont inscrites sur les emballages.