

Survol de la saison phytosanitaire 2015 et organisation des groupes de travail régionaux fruits à pépins et noyaux

Mauro Genini & Sven Knieling

Office d'arboriculture et cultures maraîchères du Canton du Valais

Résultats des contrôles pré-récolte 2015:

Pommiers: 62 parcelles contrôlés (sans variétés tardives)

% de pommes touchées			
Dégâts	Moyenne	Max	Causés par:
Total ravageurs = 5.2 %	3.5	33.0	Carpocapse
	0.0	0.0	Capua
	0.3	2.0	Chenilles
	0.4	4.4	Hoplocampe
	0.4	3.4	Puceron cendré
	0.0	0.0	Pou de San Jose
	0.7	4.6	Oiseaux
Total maladies = 1.1%	0.8	12.6	Tavelure
	0.3	4.0	Oidium
Total accident = 10.2%	2.4	70.0	Roussissure
	0.3	4.4	Stip
	5.3	44.0	Grêle
	1.3	8.8	Froid, gel
	0.9	6.2	Coup de soleil

Mais aussi:

Forte pression d'**anthonome** à Bramois et Conthey

5% des parcelles avec attaques importantes d'**araignée rouge**:

⇒ **Surveillance au printemps 2016**

Forte attaque de **capua** sur pousses et fruits dans une parcelle de Conthey

Résultats des contrôles pré-récolte 2015:

Poiriers (sans William's)

% de poires touchées		
Moyenne	Max	Causés par:
0.9	2.2	Carpocapse
0.5	1.1	Dégâts de psylle
4.8	11.7	Traces de psylles
0.0	0.0	Pou de San Jose
0.9	1.5	Oiseaux
0.0	0.0	Tavelure
18.4	48.0	Grêle
0.4	3.0	Froid, gel

Mais aussi:

Très forte attaque de **tenthrede** **limace** sur William's à Granges



Le tenthrede est un ravageur du cerisier, mais peut sporadiquement provoquer des fortes défoliations sur poirier.

Pas de produits spécifiques en arbo, mais les insecticides de contact et ingestion homologués sur le carpo (par ex alanto, reldan) sont efficaces

Reévaluation ciblée des produits phytosanitaires :

Attention:

De nombreux produits dont été retirés ou font l'objet de restrictions supplémentaires en 2016.

Informations disponibles sur le site de l'OFAG:

<http://www.blw.admin.ch/themen/00011/00075/index.html?lang=fr>

INSEGAR DG, HAGARG WG (fénoxycarbe)	délais d'utilisation novembre 2016
MATCH, MATCH PROFI	délais d'utilisation novembre 2016
DIMILIN SC, SC48, DIFUSE 48 SC:	Délai vente: 31.07.2016, Délai utilisation: 31.07.2017

VERTIMEC, KIRON	Spe3 : 50 m par rapport aux eaux, 1 seul traitement par année
TEPPEKI, PYRETRYNES	Classés dangereux pour les abeilles

Etc.

Les groupes de travail régionaux

Noyaux (abricots)

Groupes:

1. Sierre-Bramois
2. Fey-Baar
3. Riddes-Saillon-Aproz-
Conthey
4. Saxon
5. Martigny-Fully

Pépins

Groupes:

1. Sierre-St-Léonard-Bramois
2. Conthey-Vétroz-Ardon
3. Riddes-Saillon-Saxon
4. Fully-Charrat-Martigny

Groupes noyaux (abricots)

Contrôles

Pré-fleur (en salle le 9 mars)

- 1x Saxon (matin)
- 1x Châteauneuf (après-midi)

Post-fleur (contrôles terrain)

- 1x par région

Remarque: séance technique
cerises 1^{ère} quinzaine de juin

Types

Pré-fleur

- Lutte moniliose
- Essai argile
- Eclaircissage
- Divers

Post-fleur

- Chenilles
- Pucerons
- Anarsia
- Divers

Groupes pépins

Contrôles

Pré-fleur (contrôles terrain)

- 1x par région

Post-fleur (contrôles terrain)

- 1x par région

Été (contrôles terrain)

- 1x par région

Types

Pré-fleur

- Pucerons
- Éclaircissage
- Feu bactérien (rappel)
- Divers

Post-fleur

- Chenilles de printemps
- Acariens
- Divers

Été

- Carpocapse
- Divers

