



Le chevreuil

Capreolus capreolus

Le chevreuil est le plus petit ongulé du Valais. Les chevreuils adultes sont en général fidèles au même territoire. Dans les régions alpines, les migrations saisonnières entre les remises d'été situées à des altitudes plus élevées et les remises hivernales bénéficiant de meilleures conditions climatiques sont cependant monnaie courante.

Le chevreuil n'est pas un coureur endurant, mais en cas de danger il se glisse à couvert. Son arrière-train surélevé est parfaitement adapté à ce comportement. Une caractéristique propre au chevreuil: lorsqu'il est poursuivi, il tente de se défaire de son poursuivant en fuyant en zigzag et en revenant sur ses pas en sautant.



Chevrette en pelage d'hiver

Caractéristiques du chevreuil	
Poids	Mâles jusqu'à 30 kg Femelles jusqu'à 25 kg
Période d'accouplement (rut)	Juillet/août
Gestation	42 semaines (avec gestation différée août-décembre) effective 24 semaines
Mise bas; nombre de jeunes	Mai/juin; généralement 2 faons
Allaitement	Environ 6 mois
Cycle de la ramure (mâles adultes)	Chute: octobre-décembre; Croissance: 100 jours, décembre-avril; frottage: mars-mai
Régime alimentaire	Herbes, bourgeons, feuilles, fleurs, fruits, glands, faines
Prédateurs naturels	Lynx, renard, loup

Herbivore sélectionneur

Le chevreuil consomme principalement des herbes énergétiques, des fleurs et des fruits, mais peu de graminées. Sa panse plutôt petite et son alimentation digeste impliquent de nombreuses périodes d'alimentation courtes. Contrairement au chamois (type mixte) et au bouquetin (mangeur de fourrage grossier), le chevreuil ne peut pas se constituer si facilement des réserves sous forme de graisse pour l'hiver. Il est donc moins bien préparé aux longues périodes de disette hivernale et les hivers rigoureux peuvent lui être fatals et causer de lourdes pertes.

La gestation différée – une extraordinaire adaptation de la nature

Grâce à la gestation différée, le développement de l'ovule fécondé, respectivement de l'embryon à son stade précoce, est interrompu durant plusieurs mois. Le rut du chevreuil ne se déroule pas en automne ou au début de l'hiver comme celui des autres ongulés, mais déjà en juillet/août. La gestation différée (d'août à décembre) porte la durée effective de la gestation de la chevrette de 24 à 42 semaines, de sorte que les jeunes naissent en mai/juin et grandissent pendant la saison la plus favorable de l'année.

Gestion du chevreuil


2018



La population actuelle de chevreuils en Valais est estimée à 5800 bêtes. Les effectifs sont comptés au printemps au moyen de comptages nocturnes (recensement au phare) combinés à des comptages diurnes dans les différentes unités de gestion. Le comportement discret du chevreuil empêche cependant d'en recenser les populations de manière exhaustive. Néanmoins, la méthode de comptage fondée sur l'observation annuelle des mêmes unités de gestion permet de constater l'évolution des populations. Le territoire du canton est divisé en 56 unités de gestion du gibier, comptant chacune une sous-population de chevreuils.

Le taux de croissance annuel du chevreuil dans les régions alpines est d'environ 30%, les populations fluctuent néanmoins en fonction de la mortalité hivernale. Les méthodes et périodes de chasse diffèrent pour les chevrettes et les brocards. Le porteur du permis de chasse haute et chasse basse (permis A+B) ou d'un permis général (permis G) a le droit de prélever à balle deux chevrettes non allaitantes durant la chasse haute. Le porteur du seul permis A n'a pas le droit de chasser le chevreuil. La chasse au brocard se déroule chaque mardi et samedi durant les trois semaines suivant la chasse haute. Le chasseur a le droit de prélever deux brocards, avec ou sans chien courant, et à grenaille exclusivement. De plus, durant la chasse basse, un faon peut être prélevé dans une zone spéciale de chasse au chevreuil durant six jours définis.

Gestion du chevreuil 2018	
Effectif du printemps	5758
Sex-ratio SR = mâles : femelles	1 : 1.54
Évolution de l'effectif	Stable
Accroissement utile	30%
Gibier péri	1199
Dommages aux cultures	CHF 31'731
Objectifs	Stabilisation, diminution régionale, SR tirs 2:1 proportion faons \geq 40%
Planification des tirs	~ 1300
Résultat de la chasse et tirs complémentaires	1352 (24% de l'effectif)
Résultat de la régulation	Sex-ratio à améliorer



Sex-ratio (SR)

L'objectif est de prélever au maximum deux brocards pour une chevrette (sex-ratio 1 : 0.5). Malgré l'autorisation de prélever une deuxième chèvre durant la chasse haute, le sex-ratio des tirs ne s'est pas amélioré et se situait à 1 : 0.42 en 2018. Le taux de mortalité des jeunes catégories de chevreuil, démontre que les prélèvements peuvent y être augmentés, notamment les faons et les jeunes d'1½ ans.