

## II. Kriterien zugunsten einer stationären Durchführung

### Einleitende Bemerkungen

Ein Stern «\*» am Ende eines ICD-10-Kodes bedeutet, dass alle Codes des bezeichneten Stamms (=Buchstabe und Zahl vor \*) mit den allfälligen weiteren Stellen eingeschlossen sind.

Ein Kreis «°» bedeutet, dass dieses Kriterium für die genannte Eingriffsgruppe jeweils spezifisch angepasst wurde. Es wird unter 2. Eingriffsspezifische Kriterien präzisiert und ist *kursiv* dargestellt.

### 1. Allgemeine Ausnahmekriterien

Nr.	Kategorie	Kriterium	Allfällige Abbildung durch Standarddaten für die MedStat6 (ICD-10-GM-Kode, folgenden Eingriffen Version 20227, Alter)	Kriterium nicht anwendbar bei
<b>Alter</b>				
1.1	Kinder	≤3 Jahre	Alter	
<b>Schwere oder instabile somatische Co-Morbidität</b>				
2.1	Fehlbildungen	Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und/oder Atmungssystem	Q20*–Q34*	
3.1	Herz-Kreislauf	Herzinsuffizienz; NYHA >II	I50.13; I50.14; I50.04!; I50.05!	Kardio-Diagnostik°
3.2		Unkontrollierte arterielle Hypertonie > 160mmHg systolisch	nicht kodierbar	
4.1	Bronchopulmonal, nur im Falle einer Allgemeinanästhesie	COPD GOLD >II	J44*, mit fünfter Stelle -0 oder -1	
4.2		Asthma instabil oder exazerbiert	nicht kodierbar	
4.3		Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom (OSAS) mit AHI ≥15 und zuhause kein CPAP möglich	nicht kodierbar	
4.4		Langzeit-Sauerstofftherapie	nicht kodierbar	
5.1	Gerinnungsstörungen	Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	D65*–69*, mit Ausnahme von D68.5	
5.2		Therapeutische Antikoagulation	Z92.1	Katarakt; PTA°; Kardio-Diagnostik°
5.3	Blutverdünnung	Duale Thrombocyten-Aggregationshemmung	nicht kodierbar	Katarakt, PTA°; Kardio-Diagnostik°
6.1	Niereninsuffizienz	Niereninsuffizienz CKD >3b Eine dialysepflichtige chronische Niereninsuffizienz Stadium 5 begründet für sich keinen stationären Aufenthalt.	N18.4; N18.5	

<sup>6</sup> Die Medizinische Statistik der Krankenhäuser (MedStat) ist einsehbar unter: [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > Statistiken finden > Gesundheit > Grundlagen und Erhebungen > Medizinische Statistik der Krankenhäuser.

<sup>7</sup> Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, Version 2022 (ICD-10-GM, Version 2022) ist einsehbar unter: [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > Statistiken finden > Gesundheit > Grundlagen und Erhebungen > Nomenklaturen > Medizinische Kodierung und Klassifikationen > Instrumente zur medizinischen Kodierung > ICD-10-GM.

Nr.	Kategorie	Kriterium	Allfällige Abbildung durch Standarddaten für die MedStat <sup>6</sup> (ICD-10-GM-Kode, folgenden Eingriffen Version 20227, Alter)	Kriterium nicht anwendbar bei
6.2		Kontrastmittelallergie Nach der ersten komplikationslosen Exposition entfällt dieses Kriterium	nicht kodierbar	
7.1	Metabolisch	Diabetes Mellitus schwer einstellbar, instabil oder HbA1c > 8%	nicht kodierbar	
7.2		Adipositas (BMI ≥40) (bei Kindern: >97. Perzentil)	E66*, mit fünfter Stelle -4, -5, -6, -7, -8	Katarakt; Handchirurgie; Kardio-Diagnostik <sup>o</sup> ; PTA <sup>o</sup> ; ESWL <sup>o</sup>
7.3		Mangelernährung / Kachexie (Erwachsene: BMI <17.5; bei Kindern: PYMS-Score ≥3 und Definition der Stadien der Mangelernährung bei Kindern gemäss Kodierungshandbuch <sup>8</sup> )	E40*–E46*, mit Ausnahme von E44.1; R64; R63.6	
7.4		Schwere Stoffwechselstörungen	E70*–E72*; E74*–E77*; E80*; E84*; E85*	
9.1	Psychisch	Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen	F10*–19*, mit vierter Stelle - 0, -3, -4, -5, -6	
9.2		Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei einer ambulanten Nachsorge verunmöglichen	nicht kodierbar	
<b>Weitere Faktoren</b>				
90		Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung	Z74.3	
92		Keine kompetente <sup>9</sup> erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Std. postoperativ	nicht kodierbar	Kardio-Diagnostik <sup>o</sup> ; Herzschrittmacher <sup>o</sup> ; PTA <sup>o</sup>
93		Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi	nicht kodierbar	
94		Anfahrtszeit >60 Min. in ein Spital mit 24 Std. Notfall und entsprechender Disziplin	nicht kodierbar	Kardio-Diagnostik <sup>o</sup> ; Herzschrittmacher <sup>o</sup> ; PTA <sup>o</sup>

8 Medizinisches Kodierungshandbuch, BFS, Version 2024, Anhang: Mangelernährung, Definition Stadien der Mangelernährung bei Kindern. Einsehbar unter:  
www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > Gesundheit > Grundlagen und Erhebungen > Nomenklaturen > Medizinische Kodierung und Klassifikationen > Instrumente zur medizinischen Kodierung > Kodierungshandbuch.

9 Kompetent in dem Sinn, dass diese Person die Patientin / den Patienten bei Bedarf in geeigneter Weise unterstützen kann, notwendige Hilfe in Anspruch zu nehmen (z. B. telefonieren, zum Taxi begleiten, etc.).

## 2. Eingriffsspezifische Ausnahmekriterien

Nr.	Betroffene Eingriffe	Kriterium
<b>Bewegungsapparat</b>		
BH1	Handchirurgie allgemein	Gestielte Lappenplastiken
BH2		OSME kombiniert an Radius und Ulna oder im proximalen Drittel des Arms.
BH3		Rezidiv-CTS
BH5	Handchirurgie, M. Dupuytren	> 2 Strahlen
BH6		> 2 Gelenke
BH7		Lappenplastik > 10cm <sup>2</sup>
BH8		Operation bei M. Dupuytren-Rezidiv
BF1	Fusschirurgie	Gestielte Lappenplastiken
BF2		OSME bei komplizierten Gelenksfrakturen (Talus, Calcaneus, Pilon-Frakturen).
BF3		≥ 3 Hammerzehenkorrekturen auf 1 Seite in 1 Sitzung.
BF4		Diabetischer Fuss mit Polyneuropathie
BO1	OSME	OSME im Bereich Scapula, Rippen, Sternum.
BO2		OSME kombiniert an Radius und Ulna oder im proximalen Drittel des Arms
BO3		OSME bei komplizierten Gelenksfrakturen (Talus, Calcaneus, Pilon-Frakturen) oder nach grossen Weichteilrekonstruktionen
BO4		OSME von Marknägeln (nicht Spickdrähte!)
<b>Kardiologie</b>		
KD1	Kardio-Diagnostik	<i>Herzinsuffizienz Ejektionsfraktion (EF) &lt; 40% <b>und</b> NYHA &gt; II</i>
KD2		<i>Blutverdünnung Trippeltherapie</i>
KD3		<i>BMI &gt; 35</i>
KD4		<i>Keine kompetente<sup>9</sup> erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson <b>im selben Haushalt</b> in den ersten 24 Std. postoperativ</i>
KD5		<i>Anfahrtszeit &gt; <b>30Min.</b> in ein Spital mit 24h Notfall und entsprechender Disziplin</i>
KD6		<i>Antikoagulation perioperativ Notwendig (in Dosierungen, die grösser sind als die prophylaktische Therapie von venösen Thromboembolien)</i>
KH1	Herzschrittmacher (inkl. Wechsel)	<i>BMI &gt; 35</i>
KH2		<i>Keine kompetente<sup>9</sup> erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson <b>im selben Haushalt</b> in den ersten 24 Std. postoperativ</i>
KH3		<i>Anfahrtszeit &gt; <b>30 Min.</b> in ein Spital mit 24h Notfall und entsprechender Disziplin.</i>

Nr.	Betroffene Eingriffe	Kriterium
<b>Gefässe</b>		
GP1	PTA	Blutverdünnung Trippeltherapie.
GP2		Antikoagulation perioperativ Notwendig (in Dosierungen, die grösser sind als die prophylaktische Therapie von venösen Thromboembolien)
GP3		BMI > 35
GP4		Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson <b>im selben Haushalt</b> in den ersten 24 Std. postoperativ
GP5		Anfahrtszeit > <b>30 Min.</b> in ein Spital mit 24h Notfall und entsprechender Disziplin.
GP6		Mehrfach (>1) durchgeführte arterielle Gefässzugänge
GP7		Interventionen im arteriellen Stromgebiet von Aorta und viszerale Gefässe, oder Verschlussrekanalisation in allen Gefässabschnitten
GP8		St.n. Leisteneingriff bei Punktion in der Leiste.
GP9		Zugang mittels Schleuse >6F
GP12		Zusätzlich zu 6.1 Niereninsuffizienz (Allgemeine Ausnahmekriterien): Niereninsuffizienz mit GFR 30-60ml/min (ICD-10: N 18.3) in Kombination mit Herzinsuffizienz NYHA≥II (ICD-10: I50.12; I50.13; I50.14)
GP13		Extremitätenischämie Fontaine III oder IV (ICD-10: I70.23 I70.24)
GP14		Verschlussystem nicht einsetzbar (anhand CT- oder Sonographiebefund)
<b>Allgemein- / Viszeralchirurgie</b>		
CN1	Nabelhernie	laparoskopische Operationen
CN2		Implantation von Membran/ Netz
CA1	Analfistel	Verschluss durch Lappen oder Implantat
CA2		M. Crohn
<b>Urologie</b>		
UE1	ESWL	BMI < 18.5 oder >30
UE2		Infektsteine (Stein bei obstruierender Pyelonephritis oder bei rezidivierenden positiven Urikulturn mit gleichem Keim).