

Pflanzenschutzmitteilung

Nr. 28

3. September 2025

ZUR INFORMATION

- Kirschessigfliege
- Vogelschutznetze
- Reifekontrolle

REBBAU

KIRSCHESSIGFLIEGE

Diese Woche wurden 6 Proben entnommen, zwei davon (1 Syrah, 1 Humagne rouge) wiesen frische Eiablagen von *D. suzukii* auf (Löcher <1 mm). Unter diesen Umständen sollten Sie darauf achten, mögliche Befallsherde von Essigfäule aus der Parzelle zu entfernen. Das Aufbringen von Kaolin oder das Anbringen von feinmaschigen Netzen bilden eine physische Barriere, die Schäden reduziert.

Ergebnisse der Kontrolle der Eiablage in den Beeren auf Risikoparzellen

Die detaillierten Ergebnisse sind einsehbar unter: [Insect Monitoring D. suzukii Eiablage](#) (wird jeden Mittwoch aktualisiert).

Keine Eiablage	1 Humagne rouge ; 2 Pinot Noir ; 1 Gamay
> 4 % Beeren mit Eiablagen	1 Syrah ; 1 Humagne rouge

VOGELSCHUTZNETZE

Kontrollieren Sie regelmässig die Schutznetze und befreien Sie gegebenenfalls gefangene Vögel. Die Schutznetze müssen vollständig entfernt werden, sobald die Weinlese in der Parzelle beendet ist. Werden die Netze in der Parzelle oder an deren Rand belassen, können sie leicht zu einer Falle für kleine Säugetiere und Vögel werden.

Zur Erinnerung: Jeder, der ein Netz unsachgemäss anbringt und es versäumt, regelmässig zu kontrollieren, ob sich darin Tiere verheddert haben, kann von Gesetzes wegen strafrechtlich verfolgt werden.



Obstschutz und Tierschutz: Wie lässt sich beides vereinbaren?


Die Vogelschutzverbände, VITISWISS und AGRIDEA stellen dieses Lehrvideo über verschiedene Methoden zum Schutz von Rebkulturen vor Vögeln zur Verfügung.

Siehe: [Video zum Schutz der Rebberge mit Rücksicht auf Vögel und andere Tiere](#)


Es werden auch bewährte Praktiken für die Anbringung von Schutznetzen vorgestellt, um Verletzungen oder den Tod von Vögeln oder anderen Tieren zu vermeiden. Ausserdem finden Sie dort Informationen zu den Vorschriften und den Organisationen, an die Sie sich wenden können, wenn Sie verletzte oder tote Vögel oder Tiere finden oder wenn Netze falsch angebracht sind.



Netze mit hellen und auffälligen Farben wählen, Quelle Christian Linder



Haussperling typische Art die Trauben frisst, Quelle Video



Star, typische Art die Trauben frisst, Quelle Vitival-Seite

REIFEKONTROLLE

Die wöchentlichen Ergebnisse sind jeden Dienstag Ende Nachmittag verfügbar und online auf unserer Webseite <https://www.vs.ch/de/web/sca/controle-de-maturite-des-raisins> oder unserer App AgriVS einsehbar.

2025	Chasselas			Gamay			Pinot noir			Rhin		
Datum	Oe	g/l	g	Oe	g/l	g	Oe	g/l	g	Oe	g/l	g
19.08	70.9	7.5	2.48	79.0	12.0	1.73	80.3	10.1	1.32	70.3	10.2	1.86
26.08	73.0	6.3	2.60	80.5	10.3	1.74	84.3	8.4	1.38	77.2	7.9	1.87
02.09	75.1	5.6	2.62	82.7	9.0	1.82	87.1	7.5	1.43	80.7	6.7	2.01

	Arvine			Cornalin			Humagne rouge			Syrah		
	Oe	g/l	g	Oe	g/l	g	Oe	g/l	g	Oe	g/l	g
26.08	76.9	10.3	1.11	79.4	9.8	1.58	75.4	6.3	1.89	76.6	9.2	1.63
02.09	83.2	9.0	1.14	86.8	8.1	1.57	79.9	5.6	1.93	81.7	8.2	1.66

Wöchentliche Entwicklung des natürlichen Zuckergehalts in Grad Oechsle (°Oe), des Gesamtsäuregehalts (g/l) und des durchschnittlichen Traubengewichts (g).

Dienststelle für Landwirtschaft

